

成分分析表

2018. 05. 22



エッセンシャルオイル
ヒノキ葉

科・属	ヒノキ科・ヒノキ属
学名	<i>Chamaecyparis obtusa</i>
抽出部位	ヒノキ（葉）
抽出方法	水蒸気蒸留法
原産国	日本
採集地	大分県中津市耶馬渓地域
蒸留地	大分県中津市上宮永4-3-1 久恒山林(株) 本社蒸留所

物理特性

引火点温度	54.5 °C	迅速平衡密閉法(密閉式)
引火性GHS分類	≥ 23 ° C 及び ≤ 60 ° C	区分 3
比重	0.89mg/cm³ (@20°C)	pH 6 (@20°C)

Hisatsune Forest
六八
Rokugatsu Yohka

六月八日 / 久恒山林株式会社
〒871-0027 大分県中津市上宮永4丁目3番地1
tel 0979-22-7944 fax 0979-22-2822
<http://rokugatsuyohkanomori.jp/>

分類	成分名	含有 (%)
モノテルペン炭化水素類	Dリモネン	12.12
	サビネン	10.28
	○シメン	4.97
	βミルセン	4.86
	γテルピネン	3.73
	αピネン	2.35
	4-カレン	0.91
	αツジエン	0.72
	カンフエン	0.67
	βピネン	0.45
セスキテルペン炭化水素類	βクベベン	4.58
	ツヨプセン	4.19
	イソレデン	1.73
	δカジネン	1.09
	セドロール	0.94
	βヒマカレン	0.33
	αクベベン	0.25
	4, 11, 11-Trimethyl-8-methylenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene	0.42
セスキテルペノンアルコール類	エレモール	1.79
	βセリネノール	1.11
	γオイデスマール	0.42
モノテルペノンアルコール類	テルピネン4オール	7.7
ジテルペン類	ヒバエン	2.41
エステル類	α酢酸テルピネオール	15.1
	酢酸ボルニル	14.05
	酢酸イソボルニル	0.97
	合計	98.14